

フォトフェイシャル® 説明・同意書

フォトフェイシャル®は、IPL (Intense Pulsed Light)という光を顔全体に照射することで様々なスキントラブルを改善する治療法です。肌に対して最小限のダメージで、少しずつ肌の状態を改善していきます。5回を1クールとして治療を行います。

【注意事項】

- ・照射時は輪ゴムでパチンとはじかれたような感覚(痛み)があります。照射後は、軽度の日焼けのようなほてり感を感じる場合がありますが、数時間で収まります。冷却することによって軽減します。
- ・照射後に皮膚の状態・皮膚の色により、軽度の発赤や腫れが生じる場合があります。
- ・照射後に、色素性病変(シミ)の色が一時的に濃くなり、軽いかさぶたが形成される場合があります。その場合、かさぶたが剥がれ落ちるまでに5~10日かかることがあります。その間は摩擦から保護し、皮膚に強い刺激を与えないようにしてください。
- ・毛細血管の治療では、一時的に血管病変が濃くなる・小さい紫斑が現れるなど場合があります。
- ・座創の治療では、一時的に炎症がひどくなったように見える場合がありますが、治療後数時間から数日以内に治まります。
- ・治療後まれに、火傷や色素沈着などの副作用が生じる可能性があります。
- ・色が薄くなる(または消える)ことを望まないホクロ(チャームポイントのホクロなど)がある場合は、施術前に担当医にご相談ください。
- ・施術後に皮膚の異常がある場合は速やかに医師にご相談ください。

【禁忌事項】 ※禁忌事項に該当する患者様は、この治療を受けることが出来ませんのでご了承ください

<input type="checkbox"/> 1か月以内に日焼けをする予定がある (海外旅行、ゴルフ、日焼けサロンなど)	<input type="checkbox"/> 活性ヘルペス、またはヘルペス病歴のある方
<input type="checkbox"/> 光感受性が高い方(全身性エリテマトーデス またはポルフィリン症の病歴など)または、 光感受性を高める薬剤、サプリメントを 服用している方	<input type="checkbox"/> 抗凝固剤を服用している方
<input type="checkbox"/> 妊娠中、または授乳中の方	<input type="checkbox"/> 前がん病変、皮膚がん、または皮膚がん の病歴のある方
<input type="checkbox"/> 免疫抑制疾患、または免疫抑制剤を服用 している方(HIV感染など)	<input type="checkbox"/> ケロイドの既往がある方
	<input type="checkbox"/> 糖尿病、てんかん、アルコール中毒、 鬱血性心疾患などの全身性疾患の方
	<input type="checkbox"/> 重度の各種皮膚疾患または炎症性皮膚疾患、 感染性皮膚疾患の方

副作用のリスクを減らし、治療の効果を上げるために、必ず施術後数日間は日焼け止めを塗って紫外線対策をしてください。(SPF30以上)

私はフォトフェイシャル®について詳しい説明を聞き、理解した上で治療を受けることに同意します。

年 月 日

本人署名 _____

神戸市中央区元町通3丁目4番5号4F TEL078-325-8016

医療法人 健英会 神戸元町通クリニック 美容皮膚科